

# ファインセーブ®フロアブル

■種類名：フロメトキン水和剤

■有効成分：フロメトキン----- 10.0%

■登録番号：第24070号（日本化薬登録）

■毒性：医薬用外劇物

■登録初年：2018.03.30

■性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

■有効年限：4年

■包装：500ml×20本

2ℓ×8本（北海道のみ）

## 【特長】

- アザミウマ類に特効的。サビダニ類にも高い効果を示す。併せて、タバコナジラミ類、小型のチョウ目害虫にも有効である。
- 新規作用機作(ミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅲ Qi を阻害する初の殺虫剤)で既存剤に感受性の低下した害虫にも有効である。
- 極めて高い速効性を示し、残効性にも優れる。
- ミツバチ・マルハナバチ・カブリダニ類等、天敵・有用昆虫に対する影響が少ない。

## 【適用内容】（2018年12月5日現在）

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロメトキンを含む農薬の総使用回数
なす	タバコナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む)	1000	100~300	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	アザミウマ類	1000~2000					
トマト	トマトサビダニ	1000					
	タバコナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む)						
ピーマン							
すいか いちご	アザミウマ類	1000~2000					
はくさい	アオムシ	1000		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
	コナガ	1000~2000					
キャベツ	アオムシ	1000		収穫3日前まで			
	アザミウマ類	1000~2000					
だいこん	コナガ		収穫14日前まで				
ねぎ	ネギハモグリバエ	2000	収穫3日前まで	3回以内	3回以内		
	アザミウマ類	1000~2000					
たまねぎ			収穫14日前まで				
ほうれんそう		2000					
茶	チャノホソガ	1000~2000	200~400	摘採14日前まで	2回以内	2回以内	
	チャノキイロアザミウマ						
かんきつ	アザミウマ類 ミカンサビダニ	2000~4000	200~700	収穫7日前まで			

## 【効果・葉害等の注意】

- 使用直前に、容器をよく振ること。
- 本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけむらのないように葉の表裏に十分散布すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に葉害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 【安全使用上の注意】

- ❖ 医薬用外劇物。取扱いには十分注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- ❖ 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- ❖ 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- ❖ 保管：直射日光を避け、食品と区別して、鍵のかかるなるべく低温な場所に密栓して保管すること。盗難、紛失の際は、警察に届け出ること。