ゴウケツ®パック

■種 類 名：トルプロカルブ粒剤
■有効成分：トルプロカルブ---------- 20.0%

■登録番号：第24108号
■毒　　性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
■登録初年：2018.08.29
■性　　状：褐色細粒　水溶性パック入り
　　1パック45g
■有効年限：5年
■包　　装：450g×10袋

【特長】

- イネいもち病に対して高い効果を示し、長い残効性が期待できる省力タイプの殺菌剤。
- 既存薬剤耐性菌にも有効である。
- もみ枯細菌病、内穎褐変病、白葉枯病などの細菌性病害にも有効。

【適用内容】（2024 年 11 月末日現在）

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ﾄﾙﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病	小包装(パック) 10 個(450g)/10a	出穂 5 日前まで 但し、 収穫 30 日前まで	1 回	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	2 回以内 （移植時までの処理は 1 回以内、本田での湛水散布、無人航空機散布、投げ入れは合計 1 回以内）

【効果・薬害等の注意】

- 小包装(パック)に使用しているフィルムは水溶性のため、濡れた手で作業したり、降雨等で破袋しないように注意すること。
- 本剤の使用に当っては、湛水深を３ｃｍ以上にし、水田に投げ入れた後は少なくとも４～５日間は湛水状態を保ち、散布後７日間は落水及びかけ流しをしないこと。
- 本剤は小包装(パック)のまま１０アール当り１０個の割合で水田に均等に投げ入れること。
- 藻や浮草が多発している水田では、拡散が不十分となり効果が劣る可能性があるので使用をさけること。
- 空袋は圃場などに放置せず、適切に処理すること。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。特に本剤を初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- 本剤は水溶性フィルムで小包装化されているため、通常の使用方法ではその該当がない。ただし、濡れた手で触らないこと。
- 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意すること。
  ① 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
  ② 皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意すること。 付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- 保管：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。
  水溶性フィルムは吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を固く閉じて保管すること。また、強く加圧されると水溶性フィルムが劣化するおそれがあるので下積みにならないようにすること。