

ホクコーフェルテラゼクサロン箱粒剤

■種類名：クロラントラニプロール・トリフルメゾピリム粒剤
■有効成分：クロラントラニプロール-----0.75%
 トリフルメゾピリム-----0.75%

■登録番号：第24126号
■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
■登録初年：2018.9.26
■性状：淡黄緑色細粒
■有効年限：5年(担い手直送規格は2年)
■包装：1kg×12袋、10kg×1袋
 40kg(担い手直送規格)

【特長】

- 抵抗性ウンカ類にも効果の高い新規殺虫剤のゼクサロンと初期害虫からチョウ目害虫まで安定した効果のフェルテラの2種混合剤。
- 育苗箱処理で、初期害虫からウンカ類、チョウ目害虫まで、幅広い害虫を長期間にわたり防除できる。
- 水稻に対する安全性が高く、は種時から移植当日まで使用できる。

【適用内容】(2024年11月末日現在)

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数	トリフルメゾピリムを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネドロオイムシ イネミズゾウムシ コブノメイガ	1kg/10a	移植時	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	1回	1回
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ イネツトムシ フタオビコヤガ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5%) 1箱当り50g	は種時(覆土前) ~移植当日				
	イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ		移植3日前 ~移植当日				
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ イネツトムシ フタオビコヤガ	高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5%) 1箱当り 50~100g)	は種時(覆土前) ~移植当日				
	イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ		移植3日前 ~移植当日				

【効果・薬害等の注意】

- 育苗箱に処理する場合は、次の注意事項を守ること。
 - ◆ 育苗箱の上から所定薬量を均一に散布し、茎葉に薬剤が付着した場合は払い落としのち、十分に灌水してから移植すること。
 - ◆ 薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように処理を行うこと。
 - ◆ 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5%)1箱当りに乾物として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整すること。
- 移植時に使用する場合には、専用の移植同時施薬機を用い、側条施用すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 誤食などのないよう注意すること。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
- ❖ 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- ❖ 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意すること。
使用後は水管理に注意すること。
器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- ❖ 保管：直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。