

# ホクコーエクスィード™ 粉剤DL

■種類名：スルホキサフロル粉剤

■有効成分：スルホキサフロル-----0.50%

■登録番号：第24142号

■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

■登録初年：2018.10.10

■性状：類白色粉末 45μm以下  
浮遊性指数20以下

■有効年限：3年

■包装：3kg×8袋

## 【特長】

- 新規系統のスルホキシイミン系殺虫剤スルホキサフロルの粉剤。
- 稲の斑点米カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイに安定した効果を示す。

## 【適用内容】(2018年10月末日現在)

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スルホキサフロルを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内

## 【効果・薬害等の注意】

- 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を1目盛程度しぼって散布すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
  - ◆ ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
  - ◆ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 【安全使用上の注意】

- ❖ 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。  
散布後は水管管理に注意すること。  
散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管すること。