ホクコーエクシード™粉剤ＤＬ

■種 類 名：スルホキサフロル粉剤
■有効成分：スルホキサフロル---------- 0.50%
™ コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標

■登録番号：第24142号
■毒　　性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
■登録初年：2018.10.10
■性　　状：類白色粉末　45μm以下
　　浮遊性指数　20以下
■有効年限：5年
■包　　装：3kg×8袋

【特長】

- 新規系統のスルホキシイミン系殺虫剤スルホキサフロルの粉剤。
- 稲の斑点米カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイに安定した効果を示す。

【適用内容】（2024 年 11 月末日現在）

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スルホキサフロルを含む農薬の総使用回数
稲	－	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3kg/10a	収穫 ７日前 まで	３回以内	散布	３回以内
水田作物 畑作物 （休耕田）	ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメムシ類		－			

【効果・薬害等の注意】

- 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を１目盛程度しぼって散布すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
  - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
  - 関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。
- 魚毒性等：水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
  散布後は水管理に注意すること。
  散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- 保管：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管すること。