

お客様各位

2022年8月3日
北興化学工業株式会社

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
此の度、2022年8月3日付で下記農薬の適用が農薬登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第24297号 カイリキZフロアブル

変更の内容

- ・ 作物名「直播水稻」を下表の適用内容で追加する。
- ・ 作物名「移植水稻」の適用雑草名に「多年生広葉雑草」を追加し、「マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ」を削除する。

【変更後の適用内容】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 <u>多年生広葉雑草</u>	移植後3日～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	500ml/10a	1回	原液湛水散布、 水口施用 又は 無人航空機による 滴下
直播水稻	一年生雑草 ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫90日前まで	500ml/10a	1回	原液湛水散布 又は 無人航空機による 滴下

イプフェンカルバゾンを含む 農薬の総使用回数	テフリルトリオンを含む 農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

【変更後の使用上の注意事項（追加・変更部分）】

- ・ 本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ヘラオモダカは3葉期まで、ウリカワは2葉期まで、（直播水稻は4葉期まで）、ミズガヤツリは草丈12cmまで、（直播水稻は草丈17cmまで）、ヒルムシロは発生期まで、オモダカはヘラ葉抽出期まで、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまで、セリは再生期までが本剤の散布適期である。

次ページへ続く

前ページから続く

- ・ オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生の期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用すること。
- ・ 稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので使用しないこと。
- ・ 隣接するほ場に水稻以外の作物が栽培されている場合は、無人航空機による本剤の滴下は行わないこと。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら ([農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧](#)) からご参照下さい。

以上