

お客様各位

2022年6月8日
北興化学工業株式会社

[新規登録・適用内容の変更一覧表示へ](#)

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
此の度、2022年6月8日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第24298号 カイリキZジャンボ

適用変更の内容

- 作物名「移植水稻」の適用雑草名に「多年生広葉雑草」を追加し、「マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、ヘラオモダカ、クログワイ、コウキヤガラ」を削除する。

【変更後の適用内容（変更部分）】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 <u>多年生広葉雑草</u>	移植後3日～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (300g)/10a	1回	水口施用 又は 水田に小包装(パック) のまま投げ入れる。

イプフェンカルバゾンを含む 農薬の総使用回数	テフリトリオンを含む 農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

【変更後の注意事項（変更部分）】

- 本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイは4葉期まで、ウリカワは3葉期まで(直播水稻は4葉期まで)、ヘラオモダカは2葉期まで、ミズガヤツリは草丈15cmまで(直播水稻は17cmまで)、ヒルムシロは発生期まで、オモダカはヘラ葉抽出期まで、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまで、セリは再生期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期である。
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生の期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用すること。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら ([農薬製品・安全データシート\(SDS\)一覧](#)) からご参照下さい。

以上