

お客様各位

2024年6月26日
北興化学工業株式会社

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、2024年6月26日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第24350号 ミリオネアフロアブル (登録会社 住友化学株式会社)

変更の内容

- ・作物名「小麦」の希釈倍数「4000倍」に適用病害虫名「ふ枯病」を追加する。
- ・作物名「ばれいしょ」の使用法「種いも瞬間浸漬」の希釈倍数「400倍」を「400～1000倍」に変更する。
- ・作物名「ばれいしょ」に適用病害虫名「夏疫病」、使用法「散布」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」の希釈倍数「4000倍」、使用法「散布」に適用病害虫名「白絹病」を追加する。
- ・作物名「さやえんどう」に適用病害虫名「うどんこ病」を追加する。
- ・作物名「りんご」に適用病害虫名「灰色かび病」を追加する。

【変更後の適用内容】 (追加・変更された作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イピルホキサリムを含む農薬の総使用回数	
小麦	雪腐大粒菌核病 雪腐小粒菌核病	2000～ 4000倍	60～150 ㍓/10a	根雪前	2回 以内	散布	4回以内 (根雪前は 2回以内、 根雪後は 2回以内)	
	うどんこ病 ふ枯病	4000倍		収穫7日 前まで				
	赤さび病	4000～ 8000倍						
ばれいしょ	黒あざ病	400倍	—	植付前	1回	10分間 種いも浸漬	4回以内 (種いもへの 処理は 1回以内、 植付後は 3回以内)	
		400～ 1000倍				種いも 瞬間浸漬		
		40倍				種いも 100kg 当り 300ml		種いも散布
		400倍				種いも 100kg 当り 3㍓		
	夏疫病	4000倍	100～300 ㍓/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布		

(次のページへ続く)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イピルルピムを含む農薬の総使用回数
ねぎ	黒腐菌核病	4000 倍	100～300 リットル/10a	収穫前日 まで	4 回 以内	株元散布	4 回以内
	白絹病	4000～ 8000 倍					
	黒斑病 白絹病 葉枯病	4000 倍					
	さび病	4000～ 8000 倍					
さやえんどう	うどんこ病 菌核病 さび病 灰色かび病	4000 倍				散布	
りんご	赤星病 うどんこ病 褐斑病 黒星病 黒点病 すす点病 すす斑病 灰色かび病 斑点落葉病 モニリア病	4000 倍	200～700 リットル/10a		3 回 以内		3 回以内

変更登録後の製品情報の詳細はこちら [\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照ください。

以上