

お客様各位

2022年6月8日  
北興化学工業株式会社

## 変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

此の度、2022年6月8日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

### 農薬名

第24432号 *カイリキZ1* 粒剤

### 適用変更の内容

- 作物名「直播水稻」の適用雑草名に「マツバイ」を追加する。

#### 【変更後の適用内容（変更のある作物のみ）】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫90日前まで	1 kg/10a	1回	湛水散布 又は 無人航空機 による散布

イプフェンカルバゾンを含む 農薬の総使用回数	テフリトリオンを含む 農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

#### 【変更後の注意事項（追加・変更）】

##### 追加部分：

- 以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけること。

\*散布後に高温傾向が続くと予想される時

##### 変更部分：

- 本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ウリカワは3葉期まで、ミズガヤツリは草丈20cmまで（直播水稻は15cmまで）、ヒルムシロは発生期まで、ヘラオモダカは2葉期まで、セリは再生期まで（直播水稻は増殖期まで）、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前、オモダカはヘラ葉抽出期まで、クログワイは草丈10cmまで、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまでが本剤の散布適期である。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら [（農薬製品・安全データシート（SDS）一覧）](#) からご参照下さい。

以上