

リディア[®]NT 箱粒剤

■種類名：フルピリミン粒剤
■有効成分：フルピリミン-----2.0%

■登録番号：第24503号（Meiji Seika ファルマ登録）
■毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指す）
■登録初年：2020.03.10
■性状：淡褐色～褐色細粒
■有効年限：4年
■包装：1kg×12袋、10kg×1袋

【特長】

- は種前・は種時～移植当日まで使用できる水稲用殺虫箱処理剤。
- 新規の殺虫成分「フルピリミン」を含有し、水稲初期害虫、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウに高い効果を有する。既存の各種殺虫剤に感受性が低下した害虫にも有効である。
- ミツバチをはじめとする有用昆虫に影響が少ない。

【適用内容】（2021年4月末日現在）

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルピリミンを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネドロオイムシ イネミズゾウムシ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5 $\frac{1}{2}$ %) 1箱当り50g	は種前	1回	育苗箱の床土に均一に混和する。	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
			は種時覆土前～移植当日		育苗箱の上から均一に散布する。	
	移植当日					
	ニカメイチュウ					

【効果・薬害等の注意】

- 本剤を育苗床土に混和する場合には薬害を生じる場合があるので、下記の注意事項を遵守すること。
 - ◆ 山土、畑土などを使用する場合は、十分に乾燥させてから使用すること。
 - ◆ 粒剤を混和した床土は高温多湿での保管をさけ、すみやかに使用すること。
 - ◆ 粒剤が破砕されるような過度な混和はさけること。
- 育苗箱に処理する場合は、次の注意事項を守ること。
 - ◆ 育苗箱の苗の上から所定薬量を均一に散布し、茎葉に付着した薬剤は払い落としたのち、十分灌水すること。
 - ◆ 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などでは薬害を生じるおそれがあるので、必ず健苗に使用すること。
- 処理苗移植の本田の整地が不均整な場合は薬害が生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出したりしないように注意すること。
- 処理苗を本田に移植したのちは、そのまま湛水状態(湛水深3～5cm)を保ち、稲苗が活着するまで田面が露出しないよう水管理に注意すること。
- 本田が砂質土壌の水田や漏水田、未熟有機物多用田の場合には使用をさけること。
- 移植後、低温が続く、苗の活着遅延が予測される場合には使用をさけること。
- 本剤の処理により、軽度の初期生育遅延や葉の黄化・褐点を認めることがあるが、その後回復するので通常の管理を維持すること。
- 容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 誤食などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
- ❖ 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- ❖ 使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意すること。
散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。