

お客様各位

2022年8月3日
北興化学工業株式会社

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
此の度、2022年8月3日付で下記農薬の適用が農薬登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第24559号 サキガケ染粒

変更の内容

- ・ 作物名「直播水稻」を下表の適用内容で追加する。
- ・ 作物名「移植水稻」の使用時期を「移植直後～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで」を「移植直後～ノビエ3葉期但し、移植後30日まで」に変更し、適用雑草名に「シズイ」「エゾノサヤヌカグサ」を追加する。

【変更後の適用内容】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ ヘラオモダカ セリ オモダカ クログワイ <u>シズイ</u> <u>エゾノサヤヌカグサ</u>	移植直後～ <u>ノビエ3葉期</u> 但し、 移植後30日まで	250g/10a	1回	湛水散布、 湛水周縁散布、 水口施用 又は 無人航空機 による散布
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで	250g/10a	1回	湛水散布、 又は 無人航空機 による散布

イプフェンカルバゾンを含む 農薬の総使用回数	テフリトリオンを含む 農薬の総使用回数	フロルピラウキシフェンベンジル を含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	3回以内

次ページへ続く

前ページから続く

【変更後の使用上の注意事項（追加・変更部分）】

- 本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの3葉期まで（直播水稲は2.5葉期まで）に時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。
ホタルイは3葉期まで（直播水稲は2葉期まで）、ウリカワ、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、ヘラオモダカは1葉期まで、ミズガヤツリは草丈15cmまで、ヒルムシロは発生盛期まで（直播水稲は発生期まで）、セリは増殖期まで（直播水稲は再生期まで）、オモダカ、クログワイは発生始期まで、シズイは草丈3cmまでが本剤の散布適期である。
- オモダカ、クログワイ、シズイは発生の期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用すること。
- 稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので使用しないこと。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら（[農薬製品・安全データシート（SDS）一覧](#)）からご参照下さい。

以上