

お客様各位

2023 年 10 月 11 日
北興化学工業株式会社

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2023 年 10 月 11 日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農 薬 名

第 2 4 6 0 6 号 **ワザアリ染粒**

変更の内容

- ・ 作物名「直播水稻」を追加する。
- ・ 作物名「移植水稻」の使用 방법에「水口施用」を追加し、適用雑草名に「オモダカ」「クログワイ」を追加する。

【変更後の適用内容】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ <u>オモダカ</u> <u>クログワイ</u>	移植直後～ ノビエ 3 葉期 但し、 移植後 30 日まで	250g/10a	1 回	湛水散布、 湛水周縁散布、 <u>水口施用</u> 又は 無人航空機 による散布
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲 1 葉期～ ノビエ 3 葉期 但し、 収穫 90 日前まで	250g/10a	1 回	湛水散布 又は 無人航空機 による散布

イブフェンカルバゾン を含む農薬の総使用回数	テフリルトリオン を含む農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内

次ページへ続く

前ページから続く

【変更後の使用上の注意事項（追加・変更部分）】

- ・本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失しないように散布すること。
なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。
ホタルイ、ウリカワは3葉期まで、ミズガヤツリは草丈20cmまで（直播水稻は草丈12cmまで）、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期まで、オモダカ、クログワイは発生始期までが本剤の散布適期である。
- ・オモダカ、クログワイは発生の期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用すること。
- ・湛水周縁散布の場合は、周縁部を移動しながら、ほ場中央部にむかって薬剤を投入すること。
- ・本剤を水口施用する場合は、田面が露出しない程度に湛水した状態で、入水時に本剤を水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させ、施用後田面水が通常の湛水状態（水深3～5cm）に達した時に必ず水を止め、田面水があふれ出ないよう注意すること。
- ・稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので使用しないこと。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら（[農薬製品・安全データシート（SDS）一覧](#)）からご参照ください。

以上