

ルミビア™FS

■種類名：クロラントラニプロール水和剤
■有効成分：クロラントラニプロール ----- 50.0%
■化管法指定物質：クロラントラニプロール [第1種] ----- 50.0%
TM コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標

■登録番号：第24771号（コルテバ・アグリサイエンス日本登録）
■毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）
■登録初年：2023.8.23
■性状：青色水和性粘稠懸濁液体
■有効年限：5年
■包装：250ml×20本

【特長】

- 水稲の主要害虫であるコブノメイガやニカメイチュウなどのチョウ目害虫、ならびにイネミズゾウムシやイネドロオイムシに高い活性があり、効果が長期間続きます。
- とうもろこしで問題となるツマジロクサヨトウに優れた活性を持ち、健全な初期生育の確保に貢献します。
- 農閑期の処理が可能で、また短時間で処理できます。

【適用内容】（2024年2月26日現在）

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ コブノメイガ フタオビコヤガ	乾燥種もみ 1kg 当り 原液4～7ml	は種前 (浸種前)	1回	種子吹き付け処理 又は 塗沫処理	1回
直播水稻	イネミズゾウムシ		は種前			
飼料用 とうもろこし (青刈り)	ツマジロクサヨトウ	乾燥種子 1000粒当り 原液 1.5～2.5ml	は種前		塗沫処理	4回以内 (は種前の塗沫 処理は1回以 内、は種後は 3回以内)
飼料用 とうもろこし (子実)						
未成熟 とうもろこし						

【効果・葉害等の注意】

- 使用量に合わせ秤量し、使いきること。
- 使用前に容器をよく振ること。
- 薬剤が種子に均一に付着するように処理すること。
- 本剤で処理した種子等は食料や動物飼料として用いないこと。
- 使用残液及び容器の洗浄水等は河川等に流さず適切に処理すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 使用の際は不浸透性手袋などを着用すること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、容器の洗浄水等は河川等に流さず適切に処理すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。