

お客様各位

2024年5月15日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2024年5月15日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第24819号 カチドキZ薬粒

適用変更の内容

・作物名「移植水稻」の使用方法に「水口施用」を追加し、適用雑草名にコウキヤガラを追加する。

【適用内容の追加】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 マツバイ、ホタルイ ウリカワ、ミズガヤツリ ヒルムシロ、セリ オモダカ、クログワイ <u>コウキヤガラ</u>	移植後3日～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	250g/10a	1回	湛水散布、 湛水周縁散布、 <u>水口施用</u> 又は 無人航空機 による散布

プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数	フロルピラウキシフェンベンジルを含む農薬の総使用回数
2回以内	3回以内

【注意事項の追加・変更】

(使用上の注意事項)

- ・本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。
ホタルイは3葉期、ウリカワは2葉期まで、ミズガヤツリは草丈12cmまで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期まで、オモダカはヘラ葉期まで、クログワイ、コウキヤガラは草丈10cmまでが本剤の散布適期である。
- ・オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生の期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。
- ・本剤を水口施用する場合は、田面が露出しない程度に湛水した状態で、入水時に本剤を水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させ、施用後田面水が通常の湛水状態（水深3～5cm）に達した時に必ず水を止め、田面水があふれ出ないように注意すること。

変更登録後の製品情報の詳細は、[こちら\(農薬製品・安全データシート\(SDS\)一覧\)](#)からご参照ください。

以上