

お客様各位

2025 年 10 月 1 日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、2025 年 10 月 1 日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農 薬 名

第 2 4 8 2 0 号 カチドキ Z 1 キロ粒剤

適用変更の内容

- ・作物名「移植水稻」の適用雑草名に「ナガエツルノゲイトウ」を追加する。

【変更後の適用内容】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 多年生広葉雑草 <u>ナガエツルノゲイトウ</u> アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植時	1kg /10a	1 回	田植同時散布機 で施用
		移植直後～ ノビエ 3 葉期 但し、 移植後 30 日まで			湛水散布 又は 無人航空機 による散布

プロピリスルフロン を含む農薬の総使用回数	フロルピラウキシフェンベンジル を含む農薬の総使用回数
2 回以内	3 回以内

【効果・薬害の注意】（変更された内容を抜粋）

- ・本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの 3 葉期までに時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。
ホタルイ、ウリカワは 2 葉期まで、ミズガヤツリは草丈 7cm まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前、オモダカはへら葉期まで、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、ナガエツルノゲイトウは草丈 10cm までが本剤の散布適期である。
- ・オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、ナガエツルノゲイトウは発生の期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら（[農薬製品・安全データシート（SDS）一覧](#)）からご参照ください。

以上