

お客様各位

2025 年 10 月 15 日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2025 年 10 月 15 日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農 薬 名

第 2 4 9 1 7 号 カクシン 1 キロ粒剤

適用変更の内容

- ・作物名「直播水稻」を追加する。
- ・作物名「移植水稻」の適用雑草名に「多年生広葉雑草」を追加し、「マツバイ」、「ホタルイ」、「ウリカワ」、「ミズガヤツリ」、「ヒルムシロ」、「セリ」、「オモダカ」、「クログワイ」、「コウキヤガラ」を削除する。

【変更後の適用内容】（追加・変更された作物のみ抜粋）

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 <u>多年生広葉雑草</u>	移植時	1kg/10a	1 回	田植同時散布機で施用
		移植直後～ ノビエ 3 葉期 但し、 移植後 30 日 まで			湛水散布 又は 無人航空機 による散布
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲 1 葉期～ ノビエ 3 葉期 但し、 収穫 90 日前 まで	1kg/10a	1 回	湛水散布 又は 無人航空機 による散布

イプフェンカルバザン を含む農薬の総使用回数	ジメスルファゼット を含む農薬の総使用回数	テフリルトリオン を含む農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内	2 回以内

(次のページに続く)

(前のページから続く)

【効果・薬害等の注意】 (変更された内容を抜粋)

- ・本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失しないように散布すること。
なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。
ホタルイは3葉期まで、ウリカワは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期まで、オモダカはヘラ葉期まで、ミズガヤツリ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは草丈10cmまでが本剤の散布適期である。
- ・オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生の期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら ([農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧](#)) からご参照ください。

以上