

アイーナ® 5フロアブル

■種類名：キノフメリン水和剤
■有効成分：キノフメリン----- 5.0%
■殺菌剤分類：52

■登録番号：第24949号
(三井化学ケイブ® & ライフソリューション株式会社登録)
■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
■登録初年：2025.2.10
■性状：類白色水和性粘稠懸濁液体
■有効年限：3年
■包装：500ml×20本、5ℓ×4缶

【特長】

- 有効成分キノフメリンは稲のいもち病菌等に対して高い抗菌活性を示す。
- 予防効果に加えて、治療効果、残効性、耐雨性を有する。
- 既存の殺菌剤に対して感受性が低下した低感受性菌、耐性菌に対しても高い活性を示す。

【適用内容】(2026年1月末日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キノフメリンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 稲こうじ病	1000倍	60~ 150ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回 以内	散布	3回以内
		300倍	25ℓ /10a				
		8倍	0.8ℓ /10a			無人航空機 による散布	

【効果・薬害等の注意】

- 使用前によく振ってから使用すること。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調節すること。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさげ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用する。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ること。
 - ◆ 散布は各散布機種種の散布基準に従って実施すること。
 - ◆ 散布に当たっては、散布機種種に適合した散布装置を使用すること。
 - ◆ 散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
 - ◆ 散布薬液の飛散によって動植物及び自動車やカーポートの塗装等へ影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
- 本剤を希釈倍数300倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 魚毒性等：水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。
無人航空機による散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう特に注意すること。
- ❖ 保管：直射日光をさげ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。