

お客様各位

2025年11月26日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第24955号 ホクヨーオーソサイド水和剤80

変更の内容

- ①作物名「さくら」を追加する。
- ②作物名「はくさい」の適用病害虫名に「軟腐病」を追加する。
- ③作物名「トマト」の適用病害虫名に「すすかひ病」を追加する。
- ④作物名「きゅうり」の適用病害虫名に「灰色かひ病」を追加する。
- ⑤作物名「ゆきやなぎ」、「せんりょう」、「花き類・観葉植物(ばら、りんどう、せんにちこう、コスモス、ひまわり、シネラリア、スイトピー、みやこわすれ、アンスリウム、斑入りアマドコロを除く)」、「ばら」、「りんどう」、「せんにちこう」、「コスモス」、「ひまわり」、「シネラリア」、「スイトピー」、「みやこわすれ」、「アンスリウム」及び、「斑入りアマドコロ」の使用時期を「発病前～発病初期」に変更する。

【変更後】(追加・変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数		
はくさい	黒斑病 白斑病 苗立枯病	600～ 1200倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	5回以内	散布	6回以内 (種子粉衣は 1回以内、 は種後は 5回以内)		
	べと病 炭疽病	600倍							
	軟腐病	800倍							
トマト	疫病	800～ 1200倍		収穫前日 まで			5回以内 (種子粉衣は 1回以内)		
	葉かひ病 灰色かひ病 すすかひ病	800倍							
きゅうり	炭疽病 褐斑病 つる枯病	600～ 800倍	200～ 700L/10a	発病前～ 発病初期	8回以内		8回以内		
	べと病	600倍							
	灰色かひ病	800倍							
さくら	炭疽病	800倍	200～ 700L/10a	発病前～ 発病初期	8回以内				

作物名	適用病害 虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	キヤプタンを 含む農薬の 総使用回数
ゆきやなぎ	苗立枯病	1000 倍	200~700L /10a	発病前～ 発病初期	8回以内	散布	8回以内
せんりょう	炭疽病	600 倍					
花き類・観葉植物 (ばら、りんどう、 せんにちこう、 コスモス、ひまわ り、シネラリア、 スイートピー、みや こわすれ、アンス リウム、斑入りア マドコロを除く)	茎腐病 立枯病 苗立枯病	600 倍					
ばら	黒星病	800 倍					
	茎腐病 立枯病 苗立枯病						
りんどう	葉枯病 茎腐病 立枯病 苗立枯病		100~ 300L /10a	発病前～ 発病初期	8回以内	散布	8回以内
せんにちこう	斑葉病 茎腐病 立枯病 苗立枯病						
コスモス	そうか病 茎腐病 立枯病 苗立枯病		600 倍				
ひまわり	べと病 黒斑病 茎腐病 立枯病 苗立枯病						
シネラリア	褐斑病 茎腐病 立枯病 苗立枯病						

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャップを含む農薬の総使用回数
スイトピー	腰折病 茎腐病 立枯病 苗立枯病						
みやこわすれ アンスリウム	根腐病 茎腐病 立枯病 苗立枯病	600 倍	100～ 300L/10a	発病前～ 発病初期	8 回以内	散布	8 回以内
斑入り アマドコロ	斑点病 茎腐病 立枯病 苗立枯病						

変更登録後の製品情報の詳細はこちら ([農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧](#)) からご参照ください。

以上