レナテン®

■種 類 名：展着剤
■有効成分：ポリオキシエチレンドデシルエーテル---------- 78.0%
■化管法指定物質：ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る）[第１種] ---------- 51.0%
ｱﾙﾌｧｰｱﾙｷﾙｰｵﾒｶﾞｰﾋﾄﾞﾛｷｼﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)（ｱﾙｷﾙ基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る）[第一種] ---------- 29.0%

■登録番号：第9946号
■毒　　性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
■登録初年：1969.05.22
■性　　状：白色透明な液体
■有効年限：5年
■包　　装：500mℓ×20本、5ﾘｯﾄﾙ×4缶

【特長】

- レナパック水和剤など除草剤処理時の専用展着剤。
- 薬液１０ﾘｯﾄﾙあたり１０～５０mℓ(ジメテナミドP・レナシル水和剤、フェンメディファム水和剤、フェンメディファム・メタミトロン水和剤、フルアジホップP乳剤、アトラジン・S-メトラクロール水和剤、アトラジン水和剤、チフェンスルフロンメチル水和剤、キザロホップエチル水和剤では１０～２０mℓ)を添加する。

【適用内容】（2024 年 11 月末日現在）

適用農薬名	作物名	使用量	使用方法
（除草剤） ジメテナミドＰ・レナシル水和剤 フェンメディファム水和剤 フェンメディファム・メタミトロン水和剤 フルアジホップＰ乳剤 アトラジン・Ｓ-メトラクロール水和剤 アトラジン水和剤 チフェンスルフロンメチル水和剤	除草剤の 登録内容の作物	10～20 mℓ/散布液 10 ﾘｯﾄﾙ	添加
（除草剤） レナシル・ＰＡＣ、リニュロン パラコート、ジクワット、ブロマシル ＤＣＭＵ、シアン酸塩、メタミトロン水和剤 フェンメディファム乳剤、クレトジム乳剤 セトキシジム乳剤		10～50 mℓ/散布液 10 ﾘｯﾄﾙ	
（除草剤） キザロホップエチル水和剤	てんさい	10～20 mℓ/散布液 10 ﾘｯﾄﾙ	

【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 除草剤以外の農薬に使用しないこと。
- 本剤を加用した除草剤は適用圃場以外では使用しないこと。
- 使用後、容器、散布器具は必ず十分水で洗うこと。
- 散布液が付着しにくい雑草（例えばメヒシバ、エノコログサなどイネ科雑草）に散布する場合は、所定の範囲内で多めに添加し、付着しやすい雑草に散布する場合は少なめに添加すること。

【安全使用上の注意】

- 通常の使用方法では毒性は低いが、誤飲などのないように注意すること。
- 魚毒性等：水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。
  散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意すること。
- 保管：直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。