

# レナテン®

- 種類名：展着剤
- 有効成分：ポリオキシエチレンドデシルエーテル----- 78.0%
- 化管法指定物質：ホリ(林シフル)アルキルエーテル(アルキ基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る) [第1種] ----- 51.0%
- アルファ-アルキルオカセド中ホリ(林シフル) (アルキ基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る) [第1種] ----- 29.0%

- 登録番号：第9946号
- 毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
- 登録初年：1969.05.22
- 性状：白色透明な液体
- 有効年限：5年
- 包装：500ml×20本、5ℓ×4缶

## 【特長】

- レナパック水和剤など除草剤処理時の専用展着剤。
- 薬液 10 ℓあたり 10～50 ml(ジメテナミドP・レナシル水和剤、フェンメディファム水和剤、フェンメディファム・メタミトロン水和剤、フルアジホップP乳剤、アトラジン・S-メトラクロール水和剤、アトラジン水和剤、チフェンスルフロンメチル水和剤、キザロホップエチル水和剤、チエンカルバゾンメチル・ホラムスルフロン水和剤では10～20 ml)を添加する。

## 【適用内容】(2025年10月1日現在)

適用農薬名	作物名	使用量	使用方法
(除草剤) ジメテナミドP・レナシル水和剤 フェンメディファム水和剤 フェンメディファム・メタミトロン水和剤 フルアジホップP乳剤 アトラジン・S-メトラクロール水和剤 アトラジン水和剤 チフェンスルフロンメチル水和剤	除草剤の登録内容の作物	10～20 ml/散布液 10 ℓ	添加
(除草剤) レナシル・PAC、リニュロン パラコート、ジクワット、ブロマシル DCMU、シアン酸塩、メタミトロン水和剤 フェンメディファム乳剤、クレトジム乳剤 セトキシジム乳剤		10～50 ml/散布液 10 ℓ	
(除草剤) キザロホップエチル水和剤	てんさい	10～20 ml/散布液 10 ℓ	
(除草剤) チエンカルバゾンメチル・ホラムスルフロン水和剤	てんさい (ALS 阻害剤耐性)		

## 【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 除草剤以外の農薬に使用しないこと。
- 本剤を加用した除草剤は適用圃場以外では使用しないこと。
- 使用后、容器、散布器具は必ず十分水で洗うこと。
- 散布液が附着しにくい雑草(例えばメヒシバ、エノコログサなどイネ科雑草)に散布する場合は、所定の範囲内で多めに添加し、附着しやすい雑草に散布する場合は少なめに添加すること。

## 【安全使用上の注意】

- ❖ 通常の使用方法では毒性は低いが、誤飲などのないように注意すること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。  
散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。